




Protocol clinic standardizat pentru medicii de familie MOARTEA SUBITĂ CARDIACĂ LA ADULT

Moarte subită cardiacă: moarte naturală, de cauză cardiacă, anunțată de pierderea bruscă a conștiinței timp de o oră de la debutul simptomelor acute; pot exista antecedente de boală cardiovasculară, dar momentul și modul decesului sunt inopinate.

Codul bolii (CIM 10): I46.0; I46.1; I46.9

1 A. SUPORTUL VITAL AVANSAT CARDIAC

1. Inițierea promptă a Suportului Vital Bazal (SVB)
2. Solicitarea Serviciului AMU cu un DEA
3. RCR și C (raport 30 compresii : 2 respirații)
4. Oxigenoterapie
5. Atașare monitor/defibrilator



În timpul RCR și C

1. Compresiuni toracice puternice și frecvente (100 în min)
 2. Asigură reexpansiunea completă a cutiei toracice
 3. Minimalizează pauzele în compresiunile toracice:
 - Protezarea căilor respiratorii (intubare/mască laringiană), verifică corectitudinea
 - Verifică poziția și conexiunile electrozilor
 - Oxigenoterapie
 4. La pacienții intubați se continuă compresiunile sternale fără pauze respiratorii
 5. Verifică pulsul la fiecare 2 minute
- Un ciclu RCR și C, 30 compresiuni și 2 insuflații, 5 – 6 cicluri ≈ 2 min
 - Asigură 8 – 10 respirații în minut
 - Exclue hiperventilarea

Se vor evalua, identifica și trata cauzele reversibile

- Hipovolemia
- Hipoxia
- Acidoza
- Hipo/hiperkaliemia
- Hipoglicemia
- Hipotermia
- Toxice
- Tamponada cardiacă
- Pneumotorace compresiv (sufocant)

B. Componenta trusei și aparatajul medical necesar acordării asistenței medicale de urgență în moartea subită cardiacă la adult

Aparataj, utilaj:

- Aparat de monitorizare a tensiunii arteriale și stetoscop
- Electrocardiograf portabil
- Defibrilator automat extern sau defibrilator semiautomat
- Aparataj pentru instalare pace maker temporar
- Oxigen și aparat pentru oxigenoterapie
- Balon portabil AMBU
- Pulsoximetru
- Capnometru
- Trusă pentru cateterizarea venelor centrale și periferice
- Trusă pentru perfuzie
- Trusă pentru cateterizarea vezicii urinare
- Trusă pentru intubație endotraheală
- Trusă pentru protezarea căilor aeriene cu pipe ofaringiene Guedel și Robertazzi câte 1 set
- Garou și seringi pentru administrarea medicamentelor intramuscular, intravenos

C. Medicamente

- Sol. Epinefrină 0,1%, 0,18%- 1 ml, nr. 20 fiole
- Sol. Amiodaronă-150 mg-5 ml, nr. 5 fiole
- Sol. Lidocaină 1%- 1ml, nr. 10 fiole
- Sol. Sulfat de Magneziu 25%-5 ml, nr. 5 fiole
- Sol. Atropină 0,1%- 1ml, nr. 4 fiole
- Sol. Na Cl 0,9%-500 ml, nr. 2 flacoane

Abrevieri folosite în document

RCR și C- resuscitarea cardio-respiratorie și cerebrală
DE secerabrală - defibrilator extern
DEA- defibrilator electric automat
FiV- fibrilație ventriculară

TV- tahicardie ventriculară
DEM- disociație electromecanică
i/v - intravenos
Numerotarea 1-12 semnifică numărul Casetelor

